

Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2024

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren											
		6	2	3	4	5–10	11 [*]	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60			
		U4			U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2				
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)																	
Tetanus ^b			G1		G2		G3 ^d							A1		A2				A ^f		
Diphtherie ^b			G1		G2		G3 ^d							A1		A2				A ^f		
Pertussis ^b			G1		G2		G3 ^d							A1		A2			A3 ^f			
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b			G1		G2		G3 ^d															
Poliomyelitis ^b			G1		G2		G3 ^d								A1							
Hepatitis B ^b			G1		G2		G3 ^d															
Pneumokokken ^b			G1		G2		G3 ^d														S ⁱ	
Meningokokken B ^c			G1		G2			G3 ^d														
Meningokokken C								G1														
Masern								G1				G2								S ^g		
Mumps, Röteln								G1				G2										
Varizellen								G1				G2										
HPV – Humane Papillomviren														G1 ^e	G2 ^e							
Herpes zoster																				G1 ^j	G2 ^j	
Influenza																					S (jährlich) ^k	
COVID-19																					G1 ^h , G2 ^h , G3 ^h	S (jährlich) ^k

Empfohlener Impfzeitpunkt

Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
A Auffrischimpfung
S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen; **Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft**
c Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen
d Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
e Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich
f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
g Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
h Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate
i Impfung mit PCV20
j Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
k Jährliche Impfung im Herbst
* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden